

Comment entretenir votre nouvelle reconstruction ?



Les premiers jours, essayez de garder votre prothèse en bouche le plus longtemps possible.

Si la prothèse vous semble gênante, si vous avez des nausées, si votre salive est plus abondante, si vous éprouvez des difficultés à parler, soyez rassuré, tous ces inconvénients disparaîtront avec le temps.

Il est préférable de s'entraîner à mettre et enlever sa prothèse devant un miroir.

Pour la retirer, utilisez les crochets ou la fausse gencive.

Par les pressions exercées sur les dents, des irritations et douleurs peuvent apparaître quelques jours après la mise en place de votre prothèse.

En cas d'irritation ou d'ulcération de la gencive ou de la muqueuse, appliquez un gel antalgique et antiseptique sur la prothèse.

Nettoyez et séchez la prothèse, puis déposez la valeur d'un petit pois de gel en regard de la gencive douloureuse.

Si la douleur persiste, consultez-nous, une simple retouche au cabinet pourra vous apporter un soulagement immédiat.

Entretien de votre prothèse

Après chaque repas, il est préférable de retirer votre prothèse et de la nettoyer. Veillez à éliminer tous les résidus alimentaires.

1• Brossez la prothèse avec une brosse spécifique et du savon de Marseille.

2 • Rincer la correctement avec de l'eau tiède.

3 • Une à deux fois par semaine, diluez un bain de bouche à la chlorhexidine dans un verre, puis laissez tremper la prothèse pendant 30 minutes ou avec un cachet de nettoyage.

Conseil : Nettoyez votre prothèse au-dessus du lavabo garni d'eau pour éviter les conséquences d'une chute.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser.